

Flash s.è.ve.

Bulletin de situation sanitaire : Santé - Environnement - Végétal

SOMMAIRE

Chenilles processionnaires du pin

Chenilles processionnaires du chêne

Chenilles de type Bombyx

Berce du Caucase

Raisin d'Amérique

Rédaction :
FREDON Bretagne - 02 23 21 18 18



FREDON Bretagne
ZA Bellevue
5 rue Antoine de Saint-Exupéry
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 23 21 18 18
Fax 02 99 27 56 89
www.fredon-bretagne.com
fredon@fredon-bretagne.com



Chenilles processionnaires du pin FIN DU RISQUE DE CONTACT AVEC LES CHENILLES URTICANTES



Piège de type collerette à décrocher et à détruire
Crédit photo : www.lamesangeverte.com

Les dernières chenilles processionnaires ont quitté leur nid pour entamer leur métamorphose. Les nids sont vides sur l'ensemble de la Bretagne.

Si vous avez posé des pièges « collerette » de type Eco-piège®, il est temps de **les décrocher du tronc des pins pour les détruire**. Cette action évite de re-contaminer une zone en favorisant l'émergence de papillons (adultes) du sac.

Pour limiter les risques de contact avec des poils urticants, il est recommandé de porter des gants et d'intervenir après une pluie pour limiter la présence de poils qui pourraient voler ; mouiller le tronc si besoin.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE



Les observations récentes sur des sites connus pour la présence de chenilles processionnaires du chêne n'ont pas permis de les observer.

Cependant, la situation peut évoluer rapidement dans les semaines, voire les jours à venir. Il convient tout de même d'être prudent en cas d'intervention dans les chênes.

CHENILLES DE TYPE BOMBYX



Chenille de *Bombyx disparate*
Source : www.papillon-en-macro.fr

Cette année, **une espèce de chenille urticante est bien présente, le Bombyx**. En Bretagne, nous avons plusieurs Bombyx urticants : le Bombyx disparate, le Bombyx cul brun et le Bombyx cul doré.

Ces espèces peuvent se retrouver sur un grand nombre de végétaux différents : arbres et arbustes d'ornement ou forestier, fruitiers. Ce sont toutes des chenilles défoliatrices (qui mangent les feuilles). Les consignes de sécurité sont les mêmes que pour les chenilles processionnaires du pin et du chêne : **Ne pas toucher les chenilles, informer et surveiller** ; une attention particulière sera portée sur les enfants.

Berce du caucase STADE DE DÉVELOPPEMENT : PRESQUE 3 MÈTRES DE HAUTEUR !

La Berce du Caucase poursuit sa croissance et **atteint près de trois mètres de hauteur à la fin du mois de mai**. La floraison devrait apparaître d'ici un mois. Le risque demeure. La consigne de sécurité consiste à **ne pas toucher la plante sans une protection complète** (peau et visage).

Le 30 mai 2017 en Ille et Vilaine - FREDON Bretagne



Raisin d'Amérique STADE DE DÉVELOPPEMENT : BOUTON FLORAL



Le raisin d'Amérique ou Phytolaque se développe rapidement. **Les fleurs sont au stade bouton floral** (la fleur n'est pas encore ouverte).

Photo prise le 30 mai 2017 en Ille et Vilaine - FREDON Bretagne

Rappel de la procédure de signalement de nouveau foyer de Berce ou de raisin d'Amérique :

Envoyer une photo par mail à la FREDON Bretagne avec vos coordonnées complètes et le lieu d'observation précis : olivier.audras@fredon-bretagne.com

Nous vous recontactons et nous déplaçons en cas de doute sur l'identification de la plante.

Des plaquettes sont disponibles sur simple demande ou en **téléchargement gratuit** :

<http://www.fredon-bretagne.com/plaquette-dinformation>